

黑豆

Glycine max (L.) Merr.

台南3號

Black Soybean Tainan 3


- ①**品種名稱**：黑豆台南3號
- ②**親 源**：黑豆本地種 × 恒春黑豆
- ③**育成時間**：1998年5月
- ④**育 成 者**：連大進、游添榮、吳昭慧、吳振碩、王裕權

⑤**育成經過**：1989年人工雜交，1992年選出，1998年命名推廣。

⑥**品種特性**：屬於青仁黑豆，種皮黑色，子葉綠色，百粒重10~13公克，株高45~77公分，主莖節數14~16個，成熟期具不易裂莢特性，且結莢位置離地面高度達10公分以上，適合機械收穫。中晚熟，生育日數春作116~126天，夏作100~110天；每公頃籽實產量春作2,800~3,310公斤，夏作約2,485公斤。豆粒的品質優良，適合豆粉加工，外觀色澤、香味及食味優。

⑦**推廣及技術轉移**：主要栽培於朴子、東石、虎尾、下營、鹽水及花東等地區，以小包裝及黑豆粉加工為主，由於其異黃酮含量高，近年來受到生技公司之青睞，用於萃取異黃酮保健成分。目前推廣面積約50公頃，年產量約90,000公斤。

撰稿：吳昭慧



- ➊ 黑豆台南3號種皮黑色，子葉綠色
- ➋ 黑豆台南3號田間生長情形

